



AVERTISSEMENTS AGRICOLES[®]

DLP 12-11-01008998


POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°12 du 26 Avril 2001 – 2 pages

Météo

Relevés météorologiques de Marlingues



Colza

Stades : « les 10 premières siliques ont une longueur supérieure à 4 cm » (G2) à « les 10 premières siliques sont bosselées ».

Sclérotinia :

Les conditions climatiques fraîches vont rallonger la floraison et donc le risque de contamination. Dans les parcelles où l'intervention remonte à plus de trois semaines, il faut assurer son renouvellement.

Charançons des siliques :

Le risque de dégât est toujours important jusqu'au stade G4. Pour le moment les populations restent en dessous du seuil de nuisibilité.

Seuil de nuisibilité: 1 charançon pour deux plantes

Orge

Stades : F1 étalée à début épiaison

Maladies foliaires :

La progression de toutes les maladies foliaires se poursuit dans les parcelles non protégées.

Traitement urgent

Blé

Stades : 2 nœuds (7) à dernières feuilles étalées (9).

Maladies foliaires :

Les conditions climatiques fraîches, n'ont permis aucune évolution des différentes maladies.

INFO PRESEPT

Les dernières contaminations sont des 24 et 25 avril. Elles devraient se poursuivre dans les prochains jours.

Colza

Renouvellement des premiers traitements Sclérotinia.

Blé

Fongicides au stade dernières feuilles étalées

Service Régional de la Protection des Végétaux
Site de Marmilhat BP 45
63370 LEMPDES
Tél. 04.73.42.14.83
Fax 04.73.90.83.70

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de la DRAF AUVERGNE

Le Directeur gérant : D. DIDELOT

Publication périodique
C.P.P.A.P n°23145AD
ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 350 F
Fax : 320 F

Situation au 25/04/01 :

**Le risque reste important
sauf pour les semis de
novembre en Limagne.**

**Risque moyen sur les postes
de Maringues, Aulnat et
Issoire.**

**Risque faible pour Plauzat et
Brioude.**

Prévisions au 25/04/01 :

**Risque fort sur les postes de
Maringues, Aulnat et Issoire.
Maintien du risque faible sur
les postes de Plauzat et
Brioude.**

Préconisations maladies :

**Les parcelles ayant reçues un
premier fongicide doivent
recevoir un nouveau
traitement haut de gamme au
stade dernière feuille étalée
(strobilurine et/ou Opus à
dose pleine).**

**Seules, quelques parcelles de
Limagne, où aucune «trace»
de rouille ou de septoriose
n'est notée sur F4 ou F3
peuvent attendre
l'application du fongicide.**